

CD45 S-pluriBead® anti-hu

Order No.:19-04500-10



Beschreibung

CD45 S-pluriBeads® eignen sich zur schnellen positiven Zellseparation von CD45+ Zellen aus humanem Probenmaterial. Die Fängerpartikel können ohne Probenvorbereitung zur Zellisolation direkt im Blut (Vollblut), **Buffy Coat** oder Zellkulturen eingesetzt werden. Die zielspezifischen nicht-magnetischen Fängerpartikel (monodisperse Polystyrol Microbeads) werden direkt zum Probenmaterial hinzugefügt und dann mit unserem universellen Mischgerät dem **pluriPlix®** oder einem Horizontalmischer gemischt. Während der Inkubationszeit binden die CD45 positiven Zellen an die spezifische Oberfläche der nicht magnetischen pluriBeads®. Anschließend werden die Fängerpartikel, mit den gebundenen Zellen, mit Hilfe eines **pluriStrainer S (30µm)** von allen nicht gebundenen Zellen abgetrennt. Im letzten Schritt werden die Zielzellen von den pluriBeads®, mit unserem **Ablösepuffer** (unterstützt durch den **Connector Ring**) schonend abgelöst. Die angereicherten CD45+ Zellen stehen anschließend für weitere Downstream-Applikationen wie Zellkulturexperimente oder FACS Analysen zur Verfügung. Zur Isolation Zell spezifischer RNA, DNA oder Proteinen können die gebundenen Zellen, ohne den Ablöseschritt, direkt auf dem **pluriStrainer S (30µm)** lysiert werden. pluriStrainer® als auch die pluriBeads® sind für den klassischen Zellaufschluss mit der Guanidiniumthiocyanat-Phenol-Chloroform-Extraktion geeignet.

Alle notwendigen Puffer und Verbrauchsmittel, für die schnelle Zellanreicherung mit S-pluriBeads®, finden Sie hier:

[S-pluriBead® Mini Reagent Kit](#)

[S-pluriBead® Maxi Reagent Kit](#)

Additional Information

Lieferumfang	2 ml
Spezies	Mensch
Zelltypen	Leukozyten

Probenmaterial	Vollblut, PBMC, Buffy Coat, Nabelschnurblut, Knochenmark, primäre Zelllösung
Reinheit	>90%
Lagerbedingungen	4-8 °C
Regulierungserklärung	Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.